

Tabla 1. Análisis Cualitativo de Fitoplancton-Arrastre vertical con red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Chíncha - Pisco 0811 (28-31 octubre 2008) 136° Muestreo

PERFIL	BAHIA PARACAS			
LUGAR DE MUESTREO	Punta Ripio	Atenas	Punta Ballena	Santo Domingo
ESTACION	20B	21C	23E	25G
TEMPERATURA (°C)	16.5	17.0	17.0	18.2
DIATOMEAS				
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	1	0	0	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	0	0	0
DINOFLAGELADOS				
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	0	1	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	0	0	0	1
<i>Protoperidinium crassipes</i>	0	1	1	1
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	1	1	1

PERFIL	BAHIA INDEPENDENCIA				
LUGAR DE MUESTREO	Playón	Zarate	Carhuaz	Tunga	El Queso
ESTACION	33D	34E	8H	9I	10J
TEMPERATURA (°C)	14.6	14.8	14.6	14.2	13.8
DIATOMEAS					
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	0	0	1	1	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	1	1	1	1
DINOFLAGELADOS					
<i>Dinophysis acuminata</i>	0	1	1	0	0
<i>Dinophysis caudata</i>	0	0	0	1	0
<i>Dinophysis rotundata</i>	0	0	0	0	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	0	0	0	0	1
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	0	1	1	1

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (16-25 cel/c)	cel/c= células/campo
Presente	: 1 (1-5 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 25 cel/c)	
Escaso	: 2 (6-15 cel/c)			