

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0907 (22 y 23-07-2009)
Décimo Muestreo. Programa de Verificación

PERFIL	BAHIA PARACAS			BAHIA INDEPENDENCIA				Islote Zárate
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Punta Ballena	Santo Domingo	Carhuaz	Tunga	El Queso	Sta. Rosa II	Zárate
ESTACION								
TEMPERATURA (°C)	17.1	17.3	17.9	15.6	15.6	15.4		15.6
DIATOMEAS								
<i>Pseudo-nitzschia delicatissima</i>	1	1	1	0	1	0	0	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	1	1	1	1	0	1
DINOFLAGELADOS								
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	0	1	1	1	0	1
<i>Protoperdinium crassipes</i>	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Protoperdinium depressum</i>	1	1	1	1	1	0	0	1

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (16-25 cel/c)	cel/c=células/campo
Presente	: 1 (1-5 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 25 cel/c)	
Escaso	: 2 (6-15 cel/c)			