

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0905 (13-15 mayo 2009) 4to Muestreo. Programa de Verificación.

PERFIL	BAHIA PARACAS		Islote Zárate	BAHIA INDEPENDENCIA				
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Santo Domingo	Zarate	Carhuaz	Tunga	El Queso	La Pampa	El Ancla
ESTACION	21C	25G	34E	8H	9I	10J	14N	18R
TEMPERATURA (°C)	21,0	21,0	15,6	16,7	16,5	16,0	14,9	16,0
DIATOMEAS								
<i>Pseudo-nitzschia delicatissima</i>	1	0	0	1	0	1	1	1
DINOFLAGELADOS								
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	0	0	1	0	1	0	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	0	0	0	0	0	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	1	1	1	0	1	1	0	0
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	0	0	0	0	0	0	0

LEYENDA

Ausente : 0
Presente : 1 (1-5 cel/c)
Escaso : 2 (6-15 cel/c)

Abundante : 3 (16-25 cel/c)
Muy abundante : 4 (> 25 cel/c)

cel/c= células/campo