

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0905 (29 mayo 2009) 5to Muestreo. Programa de Verificación.

PERFIL	BAHIA PARACAS		Ensenada Playón	BAHIA INDEPENDENCIA		
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Santo Domingo	Playón	Carhuaz	Tunga	El Queso
ESTACION	21C	25G	33D	8H	9I	10J
TEMPERATURA (°C)	21,3	21,2	18,1	15,5	15,3	14,8
DIATOMEAS						
<i>Pseudo-nitzschia delicatissima</i>	0	0	1	0	0	0
DINOFLAGELADOS						
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	0	1	1	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	1	1	0	0	0	0
<i>Prorocentrum minimum</i>	0	1	0	0	0	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	2	2	1	1	1	0
<i>Protoperidinium depressum</i>	0	1	0	0	0	0

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (16-25 cel/c)	cel/c= células/campo
Presente	: 1 (1-5 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 25 cel/c)	
Escaso	: 2 (6-15 cel/c)			