

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0906 (10-12 junio 2009) 6to Muestreo. Programa de Verificación.

PERFIL	BAHIA PARACAS			Ensenada Playón	BAHIA INDEPENDENCIA			
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Santo Domingo	Punta Ballena	Playón	Carhuaz	Tunga	El Queso	La Pampa
ESTACION	21C	25G	23E	33D	8H	9I	10J	14N
TEMPERATURA (°C)	20,0	22,0	19,8	16,8	17,0	17,0	16,0	16,3
DIATOMEAS								
<i>Pseudo-nitzschia delicatissima</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	0	1	0	0	0	0	0
DINOFLAGELADOS								
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	0	0	1	1	1	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	1	1	1	1	0	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	0	1	1	0	0	0	0	0
<i>Prorocentrum minimum</i>	2	2	2	0	0	0	0	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	2	1	2	1	1	1	0	1
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	1	1	1	0	1	0	1

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (16-25 cel/c)	cel/c= células/campo
Presente	: 1 (1-5 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 25 cel/c)	
Escaso	: 2 (6-15 cel/c)			