

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0906 (25-26 junio 2009) 7mo Muestreo. Programa de Verificación.

PERFIL	BAHIA PARACAS			Islote Zárate	BAHIA INDEPENDENCIA		
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Santo Domingo	Punta Ballena	Zarate	Carhuaz	Tunga	El Queso
ESTACION	21C	25G	23E	34E	8H	9I	10J
TEMPERATURA (°C)	17,0	18,8	18,5	16,5	15,9	15,9	15,7
DIATOMEAS							
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	0	0	1	0	0	0
DINOFLAGELADOS							
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	0	1	1	0	0	0
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	1	1	0	0	0
<i>Dinophysis rotundata</i>	0	1	0	0	0	0	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	1	1	1	0	0	1	0
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	1	0	1	1	1	0

LEYENDA

Ausente : 0
 Presente : 1 (1-5 cel/c)
 Escaso : 2 (6-15 cel/c)

Abundante : 3 (16-25 cel/c)
 Muy abundante : 4 (> 25 cel/c)

cel/c= células/campo