

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0907 (01 julio 2009) 8vo. Muestreo. Programa de Verificación.

PERFIL	BAHIA PARACAS				
LUGAR DE MUESTREO	Punta Ripio	Atenas	Punta Ballena	Cangrejal	Santo Domingo
ESTACION	20B	21C	23E	24F	25G
TEMPERATURA (°C)	17,1	17,1	17,3	17,3	17,5
DIATOMEAS					
<i>Pseudo-nitzschia delicatissima</i>	0	0	1	0	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	0	1	0	0
DINOFLAGELADOS					
<i>Dinophysis acuminata</i>	0	1	1	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	1	0	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	1	0	0	0	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	1	1	0	0	0
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	1	1	1	1

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (16-25 cel/c)	cel/c= células/campo
Presente	: 1 (1-5 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 25 cel/c)	
Escaso	: 2 (6-15 cel/c)			