

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0907 (09-10 julio 2009) 9no. Muestreo. Programa de Verificación.

PERFIL	BAHIA PARACAS			Ensenada Playón	BAHIA INDEPENDENCIA			
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Punta Ballena	Santo Domingo	Playón	Carhuaz	Tunga	El Queso	Sta. Rosa II
ESTACION	21C	23E	25G	20B	23E	9I	10J	12L
TEMPERATURA (°C)	16.7	16.5	18.0	17.8	16.3	16.3	16.2	15.5
DIATOMEAS								
<i>Pseudo-nitzschia delicatissima</i>	1	1	0	0	0	0	1	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	1	1	1	1	0	0
DINOFLAGELADOS								
<i>Dinophysis acuminata</i>	0	0	1	0	0	0	0	1
<i>Dinophysis caudata</i>	0	0	0	1	1	1	1	1
<i>Protoperdinium crassipes</i>	1	0	0	1	1	1	0	1
<i>Protoperdinium depressum</i>	1	0	0	1	0	1	1	1

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (16-25 cel/c)	cel/c=células/campo
Presente	: 1 (1-5 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 25 cel/c)	
Escaso	: 2 (6-15 cel/c)			