

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton-Arrastre vertical
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico en Bahía Paracas (06 noviembre 2009)
Plan de Contingencia

PERFIL	BAHIA PARACAS				
LUGAR DE MUESTREO	Santo Domingo	Zona Industrial	Int. Bahía	Pta. Ripio	Atenas
PROFUNDIDAD DE MUESTREO (m)	0 - 2,5	0 - 8	0 - 8	0 - 16	0 - 2
TEMPERATURA (°C)	17,8	15,8	15,3	15,2	15,8
DIATOMEAS					
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	0	0	1	0	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	1	1	1	1
DINOFLAGELADOS					
<i>Alexandrium monilatum</i>	0	0	0	0	1
<i>Alexandrium</i> sp.	0	0	0	1	0
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	1	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	1	1	1
<i>Protoperidinium crassipes</i>	0	1	0	1	0
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	1	1	1	0

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (11 - 20 cel/c)	cel/c=células/campo
Presente	: 1 (1 - 3 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 20 cel/c)	
Escaso	: 2 (4 - 10 cel/c)			