

Tabla 1. Análisis semicuantitativo de Fitoplancton-Arrastre vertical
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico en Bahía Paracas (16 octubre 2009)

PERFIL LUGAR DE MUESTREO PROFUNDIDAD DE MUESTREO (m) TEMPERATURA (°C)	BAHIA PARACAS					
	Santo Domingo 0 - 3,5 17,8	La Puntilla 0 - 8 17,5	Zona Industrial 0 - 9 18,0	Plataforma 0 - 12 19,4	Punta Ripio 0 - 17 18,5	Atenas 0 - 3,5 17,5
DIATOMEAS						
<i>Pseudo-nitzschia</i> cf. <i>delicatissima</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	1	1	1	1
DINOFLAGELADOS						
<i>Dinophysis acuminata</i>	4	4	4	4	2	2
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	2	2	1	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	1	1	0	1	0	0
<i>Dinophysis</i> sp.	1	0	0	0	1	0
<i>Protoperdinium crassipes</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Protoperdinium depressum</i>	1	1	1	1	1	1

LEYENDA

Ausente : 0
Presente : 1 (1-3 cel/c)
Escaso : 2 (4-10 cel/c)

Abundante : 3 (11-20 cel/c)
Muy abundante : 4 (> 20 cel/c)

cel/c=células/campo