

Tabla 2. Análisis semicuantitativo de Fitoplancton-Arrastre vertical
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico en Bahía Paracas (19 octubre 2009)

PERFIL	BAHIA PARACAS			
LUGAR DE MUESTREO	Santo Domingo	Zona Industrial	Punta Ripio	Atenas
PROFUNDIDAD DE MUESTREO (m)	0 - 3,5	0 - 9	0 - 17	0 - 3,5
TEMPERATURA (°C)	17,3	16,8	15,1	15,4
DIATOMEAS				
<i>Pseudo-nitzschia</i> cf. <i>delicatissima</i>	1	1	1	1
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	1	1
DINOFLAGELADOS				
<i>Dinophysis acuminata</i>	4	3	2	2
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	1	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	1	1	0	0
<i>Dinophysis</i> sp.	1	0	1	0
<i>Protoperdinium crassipes</i>	1	1	1	1
<i>Protoperdinium depressum</i>	1	1	1	1

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (11-20 cel/c)	cel/c=células/campo
Presente	: 1 (1-3 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 20 cel/c)	
Escaso	: 2 (4-10 cel/c)			