

Tabla 3. Análisis semicuantitativo de Fitoplancton-Arrastre vertical
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico en Bahía Paracas (21 octubre 2009)

PERFIL	BAHIA PARACAS					
LUGAR DE MUESTREO	Santo Domingo	Zona Industrial	Centro de Bahía	Sequi6n	Punta Ripio	Atenas
PROFUNDIDAD DE MUESTREO (m)	0- 3,5	0-9	0- 9	0- 3	0- 17	0 - 3,5
TEMPERATURA (°C)	16,6	16,8	15,5	17,4	15,0	15,6
DIATOMEAS						
<i>Pseudo-nitzschia</i> cf. <i>delicatissima</i>	0	1	1	0	1	1
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	1	1	1	1	0
DINOFLAGELADOS						
<i>Dinophysis acuminata</i>	4	4	1	1	1	3
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	0	1	0	0	0	1
<i>Protoperidinium crassipes</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	1	1	1	1	1

LEYENDA

Ausente : 0
Presente : 1 (1- 3 cel/c)
Escaso : 2 (4 -10 cel/c)

Abundante : 3 (11-20 cel/c)
Muy abundante : 4 (> 20 cel/c)

cel/c=células/campo