

Tabla 4. Análisis semicuantitativo de Fitoplancton-Arrastre vertical
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico en Bahía Paracas (23 octubre 2009)

PERFIL	BAHIA PARACAS				
LUGAR DE MUESTREO	Santo Domingo	Zona Industrial	Centro de Bahía	Punta Ripio	Atenas
PROFUNDIDAD DE MUESTREO (m)	0 - 3,5	0 - 9	0 - 9	0 - 17	0 - 3,5
TEMPERATURA (°C)	17,1	16,9	16,5	15,1	15,9
DIATOMEAS					
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	0	0	1	1	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	0	1	1	0
DINOFLAGELADOS					
<i>Dinophysis acuminata</i>	4	3	2	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	1	0	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	0	1	0	0	0
<i>Protoperdinium crassipes</i>	1	1	1	1	1
<i>Protoperdinium depressum</i>	1	1	1	1	1

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (11-20 cel/c)
Presente	: 1 (1- 3 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 20 cel/c)
Escaso	: 2 (4 -10 cel/c)		