

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico en Pisco 0904 (03-08 abril 2009) 2do Muestreo. Programa de Verificación.

PERFIL	CHINCHA-ICA			BAHIA PARACAS	
LUGAR DE MUESTREO	Jaguay	Wakama	La Antena	Atenas	Santo Domingo
ESTACION	30A	31B	32A	21C	25G
TEMPERATURA (°C)	22,0	22,9	23,5	19,0	20,9
DIATOMEAS					
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	0	0	0	0
DINOFLAGELADOS					
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	0	0	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	0	1	1	1	1
<i>Dinophysis</i> cf. <i>rotundata</i>	0	0	0	1	0
<i>Dinophysis tripos</i>	0	0	0	0	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	1	0	1	1	1
<i>Protoperidinium depressum</i>	0	0	1	1	1

PERFIL	BAHIA INDEPENDENCIA		
LUGAR DE MUESTREO	Carhuaz	Tunga	El Queso
ESTACION	8H	9I	10J
TEMPERATURA (°C)	16,6	16,8	14,6
DIATOMEAS			
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	1
DINOFLAGELADOS			
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	2	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	0
<i>Dinophysis</i> cf. <i>rotundata</i>	0	0	0
<i>Dinophysis tripos</i>	0	1	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	0	0	0
<i>Protoperidinium depressum</i>	0	0	1

LEYENDA

Ausente : 0
 Presente : 1 (1-5 cel/c) Abundante : 3 (16-25 cel/c) cel/c= células/campo
 Escaso : 2 (6-15 cel/c) Muy abundante : 4 (> 25 cel/c)