

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco (13-18 setiembre 2009). 14to Muestreo.
Programa de Verificación

PERFIL	BAHIA PARACAS			Ensenada Playón	BAHIA INDEPENDENCIA			
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Punta Ballena	Santo Domingo	Playón	Carhuaz	Tunga	El Queso	Punta Carreta
TEMPERATURA (°C)	16,8	16,6	17,4	14,9	14,7	14,6	14,7	14,3
DIATOMEAS								
<i>Pseudo-nitzschia delicatissima</i>	1	1	0	1	1	1	1	1
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	1	1	1	1	0	0
DINOFLAGELADOS								
<i>Dinophysis acuminata</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Dinophysis caudata</i>	0	1	0	1	0	1	0	1
<i>Protoperidinium depressum</i>	0	1	1	1	1	1	1	1

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (16-25 cel/c)
Presente	: 1 (1-5 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 25 cel/c)
Escaso	: 2 (6-15 cel/c)		

cel/c=células/campo