

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico en Pisco 0903 (24-27 marzo 2009) 1er Muestreo

PERFIL	BAHIA PARACAS							BAHIA LAGUNILLAS	Ensenada Playón
LUGAR DE MUESTREO	Punta Ripio	Atenas	Cangrejal	Chaco/La Puntilla	Zona Industrial	San Andrés	Muelle fiscal y Río	Lagunillas	Playón
ESTACION	20B	21C						27A	33D
TEMPERATURA (°C)	19.7	18.9	19.0	21.9	24.8	24.7	24.7	19.9	15.6
DIATOMEAS									
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	0	0	0	0	0	1	1	0	1
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DINOFLAGELADOS									
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	1	1	1	1	0	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	0
<i>Dinophysis cf. rotundata</i>	1	1	0	0	1	1	0	0	0
<i>Protoperdinium crassipes</i>	1	1	1	2	1	1	1	1	0
<i>Protoperdinium depressum</i>	1	0	1	1	1	1	1	1	0

PERFIL	Islote Zárate	BAHIA INDEPENDENCIA							
LUGAR DE MUESTREO	Zarate	El Chuchio	Canastones	El Queso	Morro Quemado	Santa Rosa II	La Pampa	Punta Carretas	La Poza
ESTACION	34E	3C	6F	10J	11K	12L	14N	17Q	
TEMPERATURA (°C)	15.5	19.7	19.0	18.2	16.9	14.8	16.0	17.2	22.8
DIATOMEAS									
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	0	1	1	0	1	0	0
DINOFLAGELADOS									
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	2	2	1	1	1	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	0	1	1	0	0	0	0	1	1
<i>Dinophysis cf. rotundata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Protoperdinium crassipes</i>	0	1	1	0	0	0	1	1	0
<i>Protoperdinium depressum</i>	0	1	1	1	1	0	0	1	0

LEYENDA

Ausente : 0
Presente : 1 (1-5 cel/c)
Escaso : 2 (6-15 cel/c)

Abundante : 3 (16-25 cel/c)
Muy abundante : 4 (> 25 cel/c)

cel/c= células/campo