




**INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ**  
**RESUMEN MENSUAL DE LA PESQUERÍA COMERCIAL EN PUCALLPA – UCAYALI**  
 Seguimiento – Monitoreo Biológico

Del 01 al 30 de Noviembre de 2010


**1. Variación porcentual de las capturas ( t) por especies en puerto de Pucallpa.**

Puerto Pucallpa	Nov-10	Oct-10	%Variación Nov/Oct
	Captura (t)	Captura (t)	
Boquichico	11.6	49.7	-76.6
Llambina	51.0	34.3	48.8
Chiochio	40.47	28.7	40.8
Sardina	12.5	12.0	4.4
Palometa	0.8	1.5	-44.2
Maparate	10.5	11.2	-6.4
Otros (spp)	36.1	31.5	14.6
<b>TOTAL</b>	<b>163.0</b>	<b>168.9</b>	<b>-3.5</b>


**Captura (%) de las especies monitoreadas en Puerto de Pucallpa.**



**2. Distribución porcentual de las artes de pesca utilizados por la flota de Pucallpa**



**4. Capturas (%) según principales lugares de pesca de la flota de Pucallpa**



**3. Variación porcentual e Indicadores de la Captura y Esfuerzo en puerto de Pucallpa según tipo de embarcación**


Pucallpa	Desembarque (t)		% Variación Nov/Oct	Esfuerzo Viajes	CPUE t / viaje
	Nov-10	Oct-10			
Fresquera	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
Congelera	163.0	168.9	-3.5	319.0	0.5

## 5. Principales aspectos biológicos de las especies en estudio en la región Ucayali

### a. Condición Reproductiva

MES / IGS	Sardina	Llambina	Chichio	Boquichico	Palometa	Maparate
Oct	7.19	2.88	8.45	0.87	0.69	1.79
Nov	14.13	8.52	15.21	5.23	1.27	1.38

### b. Tallas



### 6. Captura (t) e indicadores de captura y esfuerzo para los principales lugares de pesca de la flota de Pucallpa

Puerto Pucallpa	Captura (t)	Viajes de pesca	Cap/Bod	t/viaje	Rendimiento (%)
Utucuro	34.5	44	88.0	0.8	39.3
Runuya	31.2	48	98.0	0.7	31.9
Chauya	30.6	62	124.5	0.5	24.6
Abujao	7.8	29	58.0	0.3	13.4
Nueva Italia	6.6	11	24.0	0.6	27.5
Otros	52.3	125	222.0	0.4	23.6
<b>TOTAL</b>	<b>163.0</b>	<b>319</b>	<b>614.5</b>	<b>0.5</b>	<b>26.5</b>

**COMENTARIO:** En Noviembre el desembarque continua en descenso, siendo -3.5% inferior al mes de Octubre, disminuyendo en los desembarques boquichico (-76.6%) y palometa (-44.2%) y maparate (-6.4%), incrementando llambina, chiochio y sardina. El arte principal de pesca fue la hondera con un aporte al desembarque total de 69%. Los principales lugares de pesca, de acuerdo a su aporte al desembarque fueron: Utucuro, Runuya, Chauya, Abujao y Nueva Italia. Sólo se reporta embarcaciones con empleo de hielo, con una CPUE de 0.5 t/viaje. El IGS de las especies monitoreadas se halla elevado, indicador de reproducción en las especies sardina, chiochio y llambina; boquichico, palometa y maparate se hallan próximos al desove. Las tallas medias desembarcadas se incrementaron hallándose próximas o superiores a la TMM recomendada. El mayor rendimiento de pesca se obtuvo en Utucuro seguido de Runuya, Nueva Italia, Chauya y Abujao.

Blgo. José Carlos Riofrío Quijandría.  
 Tco. Víctor Muñoz Pezo