




INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ
RESUMEN MENSUAL DE LA PESQUERÍA COMERCIAL EN PUCALLPA – UCAYALI
Seguimiento – Monitoreo Biológico

Del 01 al 28 de Febrero de 2 011

Evolución de la pesquería.- El desembarque de febrero mostró un incremento del 9,1% con respecto a enero, pero comparativamente fue inferior al mes de febrero de 2 010 (-24,7%)



Variación porcentual del DTR y la CPUE considerando las artes de pesca

Medida	Mes	Hondera	Trampera	Anzuelo	N.I.
DTR (t)	Feb-11	50.9	45.0	2.0	6.1
	Ene-11	68.6	20.1	0.4	6.3
	Feb-10	106.0	25.8	0.2	6.0
Variación	Feb/Ene	-25.8	124	466	-3.2
	Feb11/Feb10	-52.0	74	890	1.0
Viajes	Feb-11	115	99	9	11
	Ene-11	102	56	1	13
	Feb-10	151	80	1	12
CPUE (t/viaje)	Feb-11	0.4	0.5	0.2	0.6
	Ene-11	0.7	0.4	0.4	0.5
	Feb-10	0.7	0.3	0.2	0.5

Los lugares de pesca más frecuentados por la flota de Pucallpa y de los cuales provinieron los mayores desembarques fueron Chauya, Utucuro y Agua Negra, obteniéndose en Chauya 0,5 t/viaje, en Utucuro 0,7 t/viaje y en Agua Negra 0,3 t/viaje. El rendimiento en los 10 principales lugares de pesca mas frecuentados osciló entre 11,6% y 76,2%, siendo el mas alto en Yahuarango y el menor en Alianza.

Variación de la CPUE y del DTR en puertos de Pucallpa (Febrero 2 010 – Febrero 2 011)

Variación porcentual del DTR y la CPUE considerando el tipo de embarcación.

Medida	Variación (%)				
	Feb-11	Ene-11	Feb-10	Feb / Ene	Feb 11/Feb 10
Desemb. Congeleros	103.9	95.2	138.0	9.1	-24.7
Desemb. Fresqueros			0.0		-100.0
Desemb. Total (t)	103.9	95.2	138.1	9.1	-24.7
CPUE (t/viaje)	0.4	0.6	0.6	-19.8	-21.5
Rendimiento (%)	22.9	28.1	28.0	-18.7	-18.3
Viajes	234	172	244	36.0	-4.1
Cap. Bodega (t)	454.5	338.5	493.5		


El 100% del desembarque registrado provino de las operaciones de pesca de las embarcaciones congeleras, con un total de 234 viajes y una CPUE de 0,4 t/viaje, inferior a enero e inferior también a febrero de 2 010. El rendimiento de pesca fue también bajo (22,9%) e inferior a enero de 2 011 y febrero de 2 010, año en que ocurrió un mínimo desembarque de la flota fresquera.

La red hondera fue la que aportó los mayores volúmenes de desembarque, pero fue inferior al de enero (variación -25,8%) y febrero de 2 010 (variación de -52%), incrementando en cambio el aporte de las redes tramperas con respecto a enero (variación de 124%) y febrero de 2 010 (variación de 74%), otra arte que evidenció un incremento fueron los anzuelos, pero con desembarques poco significativos. La CPUE con el arte de pesca principal fue de 0,4 t/viaje inferior a lo obtenido en enero 2 011 y febrero de 2 010 (0,7 t/viaje).

Principales lugares de pesca de la flota de Pucallpa durante Febrero de 2 011

Lugares de	DTR (t)	Viajes	Cap/Bod	t / viaje	Rendimiento (%)
Chauya	36.0	78	152	0.5	23.7
Utucuro	15.1	21	42	0.7	36.0
Agua Negra	9.1	31	61.5	0.3	14.9
Nueva Italia	5.5	8	24	0.7	22.7
Abujao	4.5	17	34	0.3	13.2
Yahuarango	3.8	1	5	3.8	76.2
Alianza	3.5	15	30	0.2	11.6
Tamaya	3.2	11	22	0.3	14.5
Runuya	2.8	8	12	0.4	23.4
Contamana	2.3	4	10	0.6	23.0
Otros	18.1	40	62	0.5	29.2
Total	103.9	234	454.5	0.4	22.9

Durante febrero de 2 011, la especie boquichico fue la más capturada, constituyendo el 29% del desembarque registrado, siguiendo en importancia chiochio con 21% y llambina con 12%, que significaron un aporte del 88% conjuntamente con fasaco, paña, mota, maparate, doncella, julilla y bujurqui.




Principales especies desembarcadas en los puertos de Pucallpa durante Febrero de 2 011

Monitoreo de las principales pesquerías de la flota comercial de Pucallpa (Febrero 2 011)

Especie	Desembarque Registrado (t)			Variación	
	Feb-11	Ene-11	Feb-10	Feb / Ene	Feb11 / Feb10
Boquichico	30.1	7.0	13.3	327.7	126.6
Llambina	12.9	41.6	41.6	-69.1	-69.1
Chiochio	21.7	18.2	45.7	19.5	-52.6
Sardina	0.7	3.0	1.3	-76.6	-44.7
Palometa	2.3	1.0	0.6	134.7	266.2
Maparate	3.3	4.3	3.5	-22.6	-6.8
Otros (spp)	33.0	20.2	32.0	63.4	3.0
Total	103.9	95.2	138.1	9.1	-24.7

En general, las especies monitoreadas boquichico, chiochio y palometa mostraron un incremento en el desembarque con variaciones de 327,7; 19,5 y 137,7% respectivamente; llambina, sardina y maparate mostraron variaciones negativas con respecto al mes de enero (-69,1; -76,6 y -22,6% respectivamente). Otras especies incrementaron en 63,4%, totalizando 103,9 t de pescado registradas en los desembarques en Pucallpa.

Frecuencia de longitudes de las principales especies en los desembarques de Pucallpa



Las tallas desembarcadas de boquichico, llambina y chiochio mostraron un desplazamiento hacia la izquierda de la distribución, con tallas de captura promedio de 23, 19 y 14 cm LT respectivamente (esta última superior a la TMM de la especie). Sardina mostró un ligero desplazamiento a tallas superiores con una longitud media desembarcada de 15,5 cm LT. La talla media desembarcada de palometa fue de 14 cm LT y de maparate 21 cm LT (inferiores a las TMM propuestas).

Blgo. José Carlos Riofrío Quijandría
Tco. Víctor Muñoz Pezo