



INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ
RESUMEN MENSUAL DE LA PESQUERÍA COMERCIAL EN PUCALLPA Y YARINACocha – UCAYALI
 Seguimiento – Monitoreo Biológico


Del 01 al 30 de Abril de 2009

1. Variación porcentual de las capturas (Kg) por especies según puertos.


Puerto	Abr-09	Mar-09	% Variación
	Captura (t)	Captura (t)	
Pucallpa			
Boquichico	4.6	8.3	-45.1
Llambina	24.4	29.5	-17.4
Chiochio	23.7	19.6	21.1
Sardina	0.9	0.7	23.9
Palometa	0.7	0.5	32.7
Maparate	2.2	3.9	-42.3
Otros (spp)	11.3	12.8	-11.7
TOTAL	67.7	75.2	-10.0

Puerto	Abr-09	Mar-09	% Variación
	Captura (t)	Captura (t)	
Yarinacocha			
Boquichico	0.8	0.5	61.4
Llambina	2.4	2.3	6.4
Chiochio	2.9	5.5	-47.3
Sardina	0.7	0.2	219.5
Palometa	0.5	0.2	159.5
Maparate	0.6	2.5	-77.6
Otros (spp)	4.9	3.5	39.3
TOTAL	12.7	14.7	-13.1

Captura (%) de las principales especies en Puerto de Pucallpa




Captura (%) de las principales especies en Puerto Yarinacocha




2. Distribución porcentual de las artes de pesca utilizados según puertos

Distribución (%) de las capturas según artes de pesca en Pucallpa



Distribución (%) de las capturas según artes de pesca en Yarinacocha




3. Variación porcentual e Indicadores de la Captura y Esfuerzo según puerto y tipo de embarcación


	Desembarque (t)		% Variación	Esfuerzo	CPUE
	Abril	Marzo			
Pucallpa					
Fresquera	0.4	0.8	-50.0	1.0	0.4
Congelera	67.3	105.2	-36.0	137.0	0.5
Yarinacocha					
Fresquera	6.1	0.8	656.5	73.0	0.1
Congelera	6.7	105.2	-93.7	48.0	0.1

4. Capturas (t) según principales lugares de pesca por puertos

Principales lugares de pesca de la flota de Pucallpa



Principales lugares de pesca de la flota de Yarinacocha




5. Principales aspectos biológicos de las especies en estudio en la región Ucayali

a. Condición Reproductiva

MES / IGS	Sardina	Llambina	Chichio	Boquichico	Palometa	Maparate
Mar	0.25	1.42	0.35	0.29	0.30	0.45
Abr	0.17	0.44	0.28	0.19	0.11	0.44

b. Tallas



COMENTARIO: La pesquería en puerto de Pucallpa tuvo una disminución general del 10% con respecto al mes de marzo: boquichico, llambina y maparate disminuyeron en 45, 17 y 42% respectivamente y chichocho, sardina y palometa incrementaron en 21, 24 y 32%. En Yarinacocha el desembarque disminuyó en 13% con respecto a marzo: chichocho en 47% y maparate en 79%, en cambio incrementaron boquichico en 61%, llambina en 6%, sardina en 220% y palometa en 160%. Los principales lugares de pesca para la flota de Pucallpa fueron: Utucuro, Runuya, Ahuaypa, Chauya e Imiria y para Yarinacocha: Yarinacocha, San Antonio, Milagros, Paris y Calleria. El estadio sexual es de inactividad para las especies estudiadas. En Pucallpa la flota fresquera obtuvo 0,4 t / viaje y la hielera 0,5 t / viaje. En Yarinacocha ambas flotas obtuvieron 0,1 t / viaje. Las tallas medias de captura se hallan por debajo de las TMM en todas las especies.

6. Captura (t) e indicadores de captura y esfuerzo para los principales lugares de pesca según puerto de desembarque.

Puerto Pucallpa	Captura (t)	Viajes de pesca	Cap/Bod	t/ viaje	Rendimiento (%)
Ulucuro	14.1	20	40.0	0.7	35.1
Runuya	12.9	21	54.0	0.6	23.9
Ahuaypa	12.0	14	29.0	0.9	41.5
Chauya	8.7	22	42.5	0.4	20.5
Imiria	8.6	14	35.5	0.6	24.2
Otros	11.4	47	92.0	0.2	12.4
TOTAL	67.7	138	293.0	0.5	23.1

Puerto Yarinacocha	Captura (t)	Viajes de pesca	Cap/Bod	t/ viaje	Rendimiento (%)
Yarinacocha	6.3	73	109.3	0.1	5.8
San Antonio	2.6	15	22.0	0.2	11.8
Milagros	1.0	10	17.0	0.1	5.7
Paris	0.4	2	2.5	0.2	14.6
Calleria	0.4	4	6.5	0.1	5.5
Otros	2.1	17	23.1	0.1	9.3
TOTAL	12.7	121	180.4	0.1	7.1