

# **REPORTE DE OCURRENCIAS SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL EN EL LITORAL PERUANO ROSPA 02 (Del 06 al 12/01/2025)**

El ROSPA es un producto del Programa presupuestal – PP0095 “Fortalecimiento de la pesca artesanal” y tiene fines informativos

## **Desembarques:**

Durante la semana, el desembarque de la pesca artesanal en todo el litoral alcanzó un total de 7,336.1 t (según datos preliminares del IMARPE), lo que representa un incremento del 427,4% respecto de la semana anterior.

El grupo de peces presentó los mayores volúmenes de desembarque (90,8%), seguido de los invertebrados (6,9%), otros<sup>1</sup> (1,8%); y, algas (0,5%).

Los lugares con mayores desembarques fueron: **Ilo** (20,8%), **Morro Sama** (14,3%), **Las Delicias** (14%), **Matarani** (9%), **San Andrés** (6,6%) y **Paita** (4,7%); que, en conjunto, representaron el 69,4% del total desembarcado (Fig. 1).




Figura 1.- Desembarques (t) procedentes de la pesca artesanal por grupo taxonómico y lugar, registrados durante la semana del 06 al 12/01/2025

## **Especies:**

Los recursos hidrobiológicos más relevantes en términos de volumen de desembarque fueron: *Trachurus murphyi* jurel, *Sarda chiliensis chiliensis* bonito, *Engraulis ringens* anchoveta y *Coryphaena hippurus* perico, que contribuyeron con el 39,5%, 16,1%, 12,1% y 4,8% del total, respectivamente. Con relación al **jurel**, se observó un incremento (7,9 veces) en su desembarque, registrándose principalmente en Ilo (43,9%), Morro Sama (33,3%) y Matarani (15,2%). Así mismo, respecto al **bonito**, se registró un incremento en el volumen desembarcado de 9,6 veces, reportándose mayormente en San Andrés (28,8%), Matarani (22,3%) y Ancón (15%). En cuanto a la **anchoveta**, su desembarque total incrementó, registrándose los mayores volúmenes en Las Delicias (83%), San Andrés (11,7%) y Paita (5,3%). Finalmente, en referencia al **perico**, se reportó un incremento de 25,3% en sus desembarques, registrándose principalmente en Pucusana (24,5%), Paita (23,4%) e Ilo (15,7%; Fig. 2).




Figura 2.- Desembarques (t) de las principales especies registradas por la pesquería artesanal, según lugar

<sup>1</sup> Comprende los desembarques de las ovas de peces voladores.

Especies asociadas a aguas cálidas:

A pesar de las condiciones frías del mar peruano, durante esta semana, se registraron especies (6) asociadas a aguas cálidas. Estas, son consideradas las remanentes de aquellas que ampliaron su distribución durante el último evento de El Niño, el cual duró 14 meses (febrero de 2023 a marzo de 2024) (Tabla 1).

Tabla 1.- Especies asociadas a aguas cálidas registradas en los desembarques de la pesca artesanal

| Región      | Lugar               | Especie                                        |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Lambayeque  | San José            | <i>Opisthonema libertate</i> machete de hebra  |
|             | Pimentel            | <i>Panulirus gracilis</i> langosta             |
|             | Santa Rosa          |                                                |
| La Libertad | Puerto/Caleta Morin | <i>Caranx caninus</i> jureleta                 |
| Áncash      | Chimbote            | <i>Opisthonema libertate</i> machete de hebra  |
|             |                     | <i>Panulirus gracilis</i> langosta             |
|             | Culebras            | <i>Cyclopsetta querna</i> lenguado con caninos |
|             | Casma               |                                                |
|             | El Dorado           | <i>Panulirus gracilis</i> langosta             |
| Lima        | Callao              | <i>Opisthonema libertate</i> machete de hebra  |
| Ica         | San Andrés          | <i>Polydactylus approximans</i> barbudo azul   |
|             |                     | <i>Panulirus gracilis</i> langosta             |
|             | Lagunillas          |                                                |
|             | Laguna Grande       | <i>Calamus brachysomus</i> marotilla           |

Zonas de pesca de los principales recursos:

Durante la semana, las zonas de pesca más relevantes para el **jurel** se ubicaron frente a Matarani, Ilo y Morro Sama, dentro de las 20 mn. En cuanto al **bonito**, las áreas de captura más importantes se registraron frente al Callao, Pucusana, Cerro Azul y Matarani, entre las 20 mn y 80mn. Por otro lado, las zonas de pesca para la **anchoveta** se ubicaron frente a Parachique y San Andrés, entre las 20 mn y 80 mn. Finalmente, para el **perico**, las zonas de pesca que registraron las mayores capturas se localizaron frente a Huacho, Callao, Matarani e Ilo, entre las 40 mn y 180 mn (Fig. 3).

Condiciones ambientales:

El área de observación comprende las zonas litorales adyacentes a los puntos de desembarque de la pesca artesanal monitoreados<sup>2</sup>.

- Por Tumbes, se registraron corrientes y vientos de moderada intensidad.
- Por Piura, se registraron oleajes y vientos de moderada a fuerte intensidad.




Figura 3.- Principales zonas de pesca de los recursos con mayores volúmenes de desembarque de la pesca artesanal

<sup>2</sup> IMARPE monitorea la actividad pesquera artesanal mediante el Sistema de Captación de Información de Captura y Esfuerzo de la Pesca Artesanal. Este Sistema está conformado por Observadores de Campo (62), destacados en los principales lugares de desembarque a lo largo del litoral, con la finalidad de cuantificar su potencial extractivo.

- Por Lambayeque, se registraron oleajes y vientos de ligera intensidad.
- Frente a La Libertad y Áncash, se registraron oleajes y vientos de ligera a moderada intensidad.
- Por Lima, se registraron oleajes de moderada intensidad.
- Por Ica, se registraron oleajes y corrientes de moderada intensidad.
- Frente a Arequipa, Moquegua y Tacna, las condiciones fueron normales.

Según el Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-Pesquero No. 02 (del 06 al 12 de enero de 2025) del Laboratorio de Hidrofísica Marina de la DGIOCC<sup>3</sup>; la temperatura superficial del mar (TSM) mostró un ligero aumento en las regiones Niño 3.4 (-0,76 °C) y Niño 1+2 (+0,09 °C) en comparación con la semana anterior. Frente a la costa norte, las aguas cálidas ecuatoriales alcanzaron Lambayeque, generando anomalías positivas de hasta +2,2 °C en Talara. En la costa central, las anomalías negativas disminuyeron, mientras que en la costa sur se restablecieron anomalías frías de hasta -3,0 °C frente a Bahía Independencia. Los índices locales reflejaron condiciones "neutras" a "frías". Según el pronóstico, las anomalías negativas de la TSM persistirán, y la OKE<sup>4</sup> fría continuará propagándose en el Pacífico ecuatorial oriental en enero de 2025.

**Callao, 13 de enero del 2025**

---

<sup>3</sup> Para mayor detalle de la evolución de las variables físicas en el océano y la atmósfera, de la estructura fisicoquímica del océano frente a Paita - lugar referente del mar peruano para la vigilancia climática asociada a El Niño-Oscilación del Sur, así como de indicadores biológico-pesqueros, puede consultar el siguiente enlace:  [BS OBP N°02-2025.pdf](#)

<sup>4</sup> La Onda Kelvin Ecuatorial (OKE), en el océano, es un tipo especial de ondas de gravedad que es afectada por la rotación de la Tierra y atrapada en el Pacífico ecuatorial. La OKE puede ser generada debido a pulsos de vientos del oeste y se propaga en dirección hacia las costas de Sudamérica.